


Impfen unter (medikamentöser) Immunsuppression

Auf einen Blick

Impfungen sind am wirksamsten vor Einleitung einer immunsuppressiven Medikation. Generell gilt:

- **Totimpfstoffe:**
 - **Ideal:** Impfungen bis **2 Wo** vor Beginn der Therapie abgeschlossen
 - **Unter Therapie:** Impfungen möglichst zwischen Einnahmen, evtl. Antikörper-Titer kontrollieren
- **Lebendimpfstoffe:**
 - **Ideal:** Impfungen bis **4 Wo** vor Beginn der Therapie abgeschlossen
 - **Unter Therapie:** Meist **kontraindiziert!**
 - **Nach Therapie:** Zeitabstände beachten

Ablauf für die Praxis:



	Totimpfstoffe²	Lebendimpfstoffe¹	Titerkontrolle?¹
Grad I	✓	✓ <small>*MMR ± V i.d.R. möglich!^{1,2} (Fachinformation genau auf mögliche Kontraindikationen prüfen)</small>	✗
Grad II	✓	✗ [*]	✓
Grad III	✓	✗	✓

Wie stark immungeschwächt ist Pat.?

Bei 🦠:

- Bis **2 Wo** vor Beginn der Therapie abgeschlossen
- **Unter Therapie: Zwischen Einnahmen!**

Bei 🦠:

- Bis **4 Wo** vor Beginn der Therapie abgeschlossen
- **Nach/unter Therapie: Zeitabstände beachten!**

4-8 Wo nach abgeschl. Impfserie³

1 Wiedermann et al. (2016). Impfen bei Immundefekten/ Immunsuppression – Expertenstatement und Empfehlungen, Wien Klin Wochenschr, 128 [Suppl 4]: S337–S376 | 2 Wagner et al. (2019). Impfen bei Immundefizienz. (IV) Impfen bei Autoimmunkrankheiten, bei anderen chronisch-entzündlichen Erkrankungen und unter immunsuppressiver Therapie. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2019 Apr;62(4):494–515. | 3 Niehues et al. (2017). Impfen bei Immundefizienz. (I) Grundlagenpapier. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2017 Jun;60(6):674–684. | 4 Bass et al. (2023). American College of Rheumatology Guideline for Vaccinations in Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Arthritis Rheumatol. 2023 Mar;75(3):333–348.

Werfen Sie einen Blick auf unsere Artikel, Podcasts und Tools rund ums Impfen auf impfakademie.de

