

Empfohlene Impfungen nach STIKO¹ für Kinder/Jugendliche von 12 bis 17 Jahren ohne Grunderkrankung/Immundefizienz



**IMPF
AKADEMIE**
Für medizinische Fachkreise
in Deutschland

- Fehlende Grundimmunisierungen sind nachzuholen
- Nicht komplette Grundimmunisierungen sind zu vervollständigen
- Jede Impfung zählt: Grundimmunisierungen müssen nicht neu begonnen werden

Stempel Arzt/Ärztin _____ Empfohlene Impfungen für _____
Name Patient*in/ Geburtsdatum

Impfung gegen	Nachholimpfung: Impfschema Ungeimpfte	Auffrischung nach voll- ständiger G	S/I	Weitere Hinweise	Nach Impf- pass-Check: indizierte Impfungen
Pertussis	1x	Alter 9–16 J.: 1 x	S	Mit Kombinationsimpfstoff Tdap-IPV	☐
Tetanus/ Diphtherie/ Polio (IPV)	3x 0–1– 6 Mon.#	Alter 9–16 J.: 1 x	S	N: 1. N mit Tdap-IPV, 2. und 3. N mit Td- und IPV-Impfstoff (nur 1x Pertussis nötig) A: mit Tdap-IPV-Impfstoff	N ☐ A ☐
Masern/ Mumps/ Röteln	2x 0–1 Mon.	entfällt	S	Bei gleichzeitiger Indikation für Varizellen-Impfung ggf. mit MMRV-Impfstoff LI, bei Immundefizienz oder Schwangerschaft kontraindiziert	☐
Varizellen	2x 0– 4 bis 6 Wo. (FI beachten)	entfällt	S	Ungeimpfte ohne Varizellen-Anamnese Bei gleichzeitiger Indikation für MMR-Impfung ggf. mit MMRV-Impfstoff LI, bei Immundefizienz oder Schwangerschaft kontraindiziert	☐
Hepatitis B	3x 0– 1– 6 Mon.#	entfällt	S	Je nach Impfalter Kinder- oder Erwachsenen- impfstoff verwenden (FI beachten)	☐
Meningokokken ACWY	1x	entfällt	S	1 Dosis Meningokokken ACWY Konjugatimpfstoff im Alter 12–14 J. ungeachtet des Impfstatus. N bis zum Alter von einschließlich 24 J.	☐
HPV	9–14 J.: 2x 0– 6 Mon. ab 15 J.: 3x 0– 1– 6 Mon.#	entfällt	S	Für Impfschema FI beachten! Beginn der Impfserie unter 15 J.: 2 Impfungen, Beginn der Impfserie ab 15 J.: 3 Impfungen	☐
Influenza	1x	jährlich	I	I: bei erhöhter Gefährdung aufgrund eines Grundleidens, für Haushaltskontakte oder Betreuende von Risikopersonen Bei Immundefizienz Totimpfstoff verwenden	☐
COVID-19²	1x	jährlich Impfung im Spätsommer /Frühherbst	I	I: u. a. bei Grundleiden, Bewohnende von Einrichtungen der Pflege, Haushaltskontakte und Betreuende von Personen, die keine schützende Immunantwort aufbauen können	☐
FSME	3x (Impfschema gemäß FI)	alle 3–10 J. (FI beachten)	I	I: Personen, die in FSME-Risikogebieten Zecken exponiert sind Je nach Impfalter Kinder- oder Erwachsenen- impfstoff verwenden (FI beachten)	G ☐ A ☐

jeweils Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis

Anamnese

Beruf: _____ ggf. weitere Impfungen notwendig (arbeitsmedizinische Beratung)

Reisepläne: Nein ☐ Ja ☐ Wenn ja, wohin? _____ **Gesonderte Reiseimpfberatung notwendig!**

Kontakt zu Säuglingen/Schwangeren/Immundefizienten: Nein ☐ Ja ☐

Schwangerschaft: Nein ☐ Ja ☐

Letzte Impfung am: _____ Wie wurden Impfungen bisher vertragen? _____

Aktuelles Allgemeinbefinden: _____

Allergien: (z. B. Neomycin, Hühnereiweiß) _____

Chronische Erkrankungen: (z. B. Asthma, HBV, HCV) _____

Regelmäßige Medikation: (z. B. Kortison, Marcumar, NOAK) _____

Immundefekt: Nein ☐ Ja ☐ Wenn ja, welcher? _____

Sonstige Besonderheiten: (z. B. Gerinnungsstörung, chron. Lebererkrankung, Diabetes, Dialyse, Transplantation, Asplenie)

Durchgemachte Erkrankungen: (z. B. Hepatitis A/B, Windpocken) _____

Sonstiges: _____

Hinweis:

Die Informationen in dieser Übersicht sind allgemeiner Art und können die Entscheidung des impfenden Arztes nicht ersetzen. Diese Entscheidung muss für jeden Einzelfall weiterhin nach individueller Nutzen-/Risikoabwägung erfolgen.

Diese Übersicht wurde mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Informationen stellen die derzeit gültigen STIKO-Empfehlungen dar (siehe Referenzen). GSK behält es sich ausdrücklich vor, diese Übersicht ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

GSK übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen GSK, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der aufgeführten Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern von Seiten GSK kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Diese Übersicht schließt prinzipiell alle Geschlechter mit ein. Zur besseren Lesbarkeit wird jedoch nur eine Geschlechtsform verwendet.

Abkürzungen:

Wo. = Wochen, **Mon.** = Monate, **J.** = Jahre, **S** = Standardimpfung, **I** = Indikationsimpfung, **R** = Reiseimpfung, **A** = Auffrischimpfung, **N** = Nachholimpfung, **G** = Grundimmunisierung, **FI** = Fachinformation, **LI** = Lebendimpfstoff

Quellenangaben:

- Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut – 2026: Epidemiologisches Bulletin 04/2026.
- Epid Bull 2026;28:3–30 | DOI 10.25646/14286.2
- G-BA: Schutzimpfungs-Richtlinie (<https://www.g-ba.de/richtlinien/60/>, abgerufen September 2026)