

# STIKO Empfehlungen während COVID-19



## Priorisierung von Impfungen



Alle von STIKO empfohlenen Impfungen altersentsprechend durchführen. Besonders die Grundimmunisierung sollte unbedingt zeitgerecht beginnen (ab 8 Wo.) und enden (mit 15 Mo.)



Ab 60 J: Altersbedingte Impfempfehlungen zum Schutz vor

- Pneumokokken
- Herpes zoster
- Jährliche Influenza



**Wichtig: Impfschutz bei Immunsupprimierten/Personen mit anderen gesundheitlichen Risikofaktoren.**

Bitte Impfstatus für empfohlene Indikationsimpfungen prüfen

## Anstehende Routineimpfungen



Grundsätzlich nur bei akuten, schweren Erkrankungen verschieben



COVID-19-Patienten erst nach Genesung und frühestens 4 Wo. nach letzter pos. PCR (auch wenn asymptomatisch)



COVID-19-Kontaktpersonen mit Symptommfreiheit 14 d nach letztem potenziellen Kontakt

## Praxisabläufe – Organisation



Reduzieren Sie Ansteckungsrisiken mit SARS-CoV-2 während des (Impf-)Termins bestmöglich



Gesonderte Impfsprechstunden verhindern oder reduzieren Wartezeiten



Nutzen Sie Erinnerungssysteme um an (über-) fällige Impfungen zu erinnern



Impftermine ggf. verschieben: Patient/Begleitperson mit Erkältungssymptomen



Jeden Patientenkontakt zur Prüfung des Impfstatus nutzen und versäumte Impfungen nachholen



Zahl der Impftermine gering halten: Mehr als 2 Impfungen an einem Termin möglich

### Impfungen und COVID-19: Gute Nachricht

Derzeit keine Hinweise, dass Auseinandersetzung des Immunsystems mit SARS-CoV-2 durch eine zeitnah verabreichte Impfung negativ beeinflusst wird